

## การย้ายรังเพื่อเก็บน้ำผึ้ง

การเลี้ยงผึ้งโพรงส่วนใหญ่มักเลี้ยงผึ้งโพรงในสวนมะพร้าว ซึ่งจะออกดอก(จั่น) ตลอดทั้งปี จากการสำรวจการออกดอก(จั่น)ของมะพร้าวในจังหวัดชุมพร พบว่า ช่วงที่ทะพร้าวออกจั่นน้อยเฉลี่ย 15 จั่น/เดือน ได้แก่ เดือนกันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม และกุมภาพันธ์ ส่วนช่วงที่ดอก(จั่น)มะพร้าวมีความอุดมสมบูรณ์ ออกดอก(จั่น)เฉลี่ย 40.33 จั่น/เดือน ได้แก่ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม ดังนั้น การเลี้ยงผึ้งโพรงในสวนมะพร้าวจะมีพืชอาหารที่สมบูรณ์เพียง 6 เดือนเท่านั้น เพื่อให้สามารถเก็บน้ำผึ้งได้อย่างต่อเนื่องและได้ผลผลิตดี จึงควรย้ายรังผึ้งในช่วงที่พืชอาหารไม่สมบูรณ์ โดยย้ายรังไปตั้งในพื้นที่ที่มีพืชอาหารออกดอก ดังนี้

ชนิดพืช	ช่วงเวลาการออกดอกของพืชอาหาร
เงาะ ทุเรียน	มกราคม – เมษายน
มะม่วงหิมพานต์	มกราคม – มีนาคม
ต้นเสม็ด	มิถุนายน
สาบเสือ	ธันวาคม – กุมภาพันธ์
ไม้ป่าชายเลน เช่น ลำพู ลำโรง พวงตาตุ่ม	ตุลาคม – ธันวาคม
ยางพารา	ช่วงใบเพสลาด ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม