

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม

1. การแยกขยายรัง

สามารถแยกรังชันโรงได้ปีละ 1 - 2 ครั้ง และควรพิจารณาความหนาแน่นของประชากรภายในรัง และอาหารสะสมภายในรัง ได้แก่ ถ้วยน้ำหวาน และถ้วยเกสร ต้องมีปริมาณมากพอที่จะสามารถแยกขยายรัง ซึ่งในการแยกขยายรัง จะต้องทำการสำรวจดูนางพญาชันโรง หรือหลอดนางพญาชันโรงให้สัมพันธ์กับกลุ่มหลอดไข่ และหลอดดักแด้ เพื่อให้หลอดนางพญาออกเป็นนางพญาพร้อมจรรยา และพร้อมผสมพันธุ์กับชันโรงตัวผู้ จึงจะประสบความสำเร็จในการแยกขยายรังชันโรง นอกจากนี้ หากวางรังในแหล่งอาหารที่มีดอกไม้บานและมีเกสรตลอดปี เช่น สวนมะพร้าว สวนปาล์ม จะสามารถประสบความสำเร็จในการแยกขยายรังมากขึ้น

2. การเก็บผลผลิตให้ถูกสุขลักษณะ

ภาชนะที่ใช้ในการเก็บผลผลิตน้ำผึ้งชันโรงและพรอพอลิสควรเป็นภาชนะสะอาดที่ทำจากสแตนเลสเพื่อลดการปนเปื้อน และควรเลือกสิ่งปลอมปนออกจากพรอพอลิสให้หมดก่อนที่จะนำพรอพอลิสมาจำหน่าย