

2.3 พันธุ์ครึ่ง

ลักษณะครึ่งที่ใช้ตัดไปทำพันธุ์ จะต้องเป็นครึ่งที่แก่เต็มที่ ครึ่งตัวเมียที่สมบูรณ์และมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่ตัดก่อน ลูกครึ่งออกจากซากรังเก่า ระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน โดยสังเกตจาก

1. ภายนอกของรังครึ่ง จะต้องหนาเกาะหุ้ม รอบกิ่งหรือเกือบรอบกิ่งและเกาะยาวไปตามกิ่ง ไม่ขาดเป็นตอนๆ แต่ไม่มีร่องรอยของแมลงศัตรู
2. ภายในรังครึ่ง ครึ่งพันธุ์ที่คืนนั้นเมื่อปั้งดูจะพบว่าภายในมีช่องเล็กๆ มากมาย คล้ายซี่หวี และมีช่องรังกว้าง ภายในช่องรังกว้าง ภายในช่องรังมีตัวครึ่งรูปร่างกลม ซึ่งมีสีแดงอยู่ แสดงว่าครึ่งตัวเมียนั้นยังมีชีวิตและสมบูรณ์อยู่ แต่ถ้าปั้งครึ่งแล้วเห็นช่องเล็ก ๆ ภายในรังครึ่งแคบและตัวครึ่งส่วนใหญ่แห้งตายแสดงว่ารังครึ่งนี้ไม่ควรนำไปใช้ทำพันธุ์

- การตัดครึ่งทำพันธุ์ การตัดครึ่งไปทำการขยายพันธุ์ปีหนึ่งตัด 2 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1 : ช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน เป็นการตัดครึ่งที่เลี้ยงในฤดูร้อน ครึ่งในช่วงนี้ผลผลิตค่อนข้างต่ำ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมตัดครึ่งในช่วงนี้เนื่องจากได้ผลผลิตน้อย มักเก็บไว้ทำพันธุ์

ครั้งที่ 2 : ช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม เป็นการตัดครึ่งที่เลี้ยงในฤดูฝน จะได้ผลผลิตสูง รังครึ่งที่ได้ปมหนาและสมบูรณ์

- การห่อพันธุ์ครึ่ง

ครึ่งพันธุ์ 1 กิโลกรัม ควรแบ่งห่อเป็น 6 - 10 มัด แล้วจึงนำพันธุ์ครึ่ง 2 มัด ผูกติดกันเพื่อสะดวกต่อการปล่อยโดยวิธีแขวนเศษครึ่งพันธุ์ที่หลุดออกเป็นท่อนเล็กๆ อาจรวมใส่ตะกร้าเล็กรวมกัน เพื่อนำไปแขวนตามกิ่งไม้ได้ นอกจากนี้ยังใช้ววนพลาสติกสีฟ้าตาข่ายเล็ก ๆ ที่นิยมใช้กันขอบบ่อเลี้ยงปลาห่อครึ่งพันธุ์ได้ด้วย การห่อด้วยตาข่ายเล็กๆ นี้มีข้อดี คือ ช่วยป้องกันไม่ให้ตัวอ่อนของแมลงศัตรูครึ่งออกจากรังไปผสมพันธุ์เพิ่มจำนวนแล้วกลับมาทำความเสียหายให้แก่ครึ่งที่เลี้ยงไว้ได้



ภาพที่ 2 แสดงวิธีห่อครึ่งเพื่อแขวนคร่อมกิ่งไม้